

# Devoir maison n° 19

À rendre le lundi 4 mai 2026

PROBLÈME : AUTOUR DES RACINES CARRÉES D'UN ENDOMORPHISME

---

## Rappels et notations

On rappelle que, lorsque  $f$  désigne un endomorphisme d'un espace vectoriel  $E$ , alors on note  $f^0 = \text{Id}_E$ ,  $f^1 = f$  et, pour tout entier  $k \geq 2$ ,  $f^k = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{k \text{ fois}}$ . En particulier  $f^2 = f \circ f$ .

Lorsque  $f$  est un endomorphisme de  $E$  et  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  est un polynôme de degré  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $P(f)$  l'endomorphisme

$$\sum_{k=0}^n a_k f^k = a_0 \text{Id}_E + a_1 f + a_2 f^2 + \dots + a_n f^n.$$

Autrement dit, pour tout  $x \in E$ ,

$$P(f)(x) = \sum_{k=0}^n a_k f^k(x) = a_0 x + a_1 f(x) + a_2 f^2(x) + \dots + a_n f^n(x).$$

Si  $P$  est le polynôme nul, alors on convient que  $P(f)$  désigne l'endomorphisme nul de  $E$ . On rappelle que, si  $P$  et  $Q$  sont des polynômes, alors

- pour tous réels  $\lambda$  et  $\mu$ ,  $(\lambda P + \mu Q)(f) = \lambda P(f) + \mu Q(f)$ .
- $P(f) \circ Q(f) = (PQ)(f) = (QP)(f) = Q(f) \circ P(f)$ .

## Problématique et plan du problème

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. On dit qu'un endomorphisme  $f$  de  $E$  admet une racine carrée si il existe un endomorphisme  $u$  de  $E$  telle que  $u^2 = f$ . On dit alors que  $u$  est une racine carrée de  $f$ .

L'objectif de ce problème est d'étudier l'existence de racines carrées de  $f$  et d'étudier quelques unes de leurs propriétés des racines carrées de  $f$  lorsqu'elles existent. Il consiste en sept parties :

- Les parties A et C se concentrent sur quelques résultats généraux utiles aux autres parties.
- Les parties B, D, E sont indépendantes entre elles mais utilisent des résultats de la partie A. La partie E utilise aussi des résultats de la partie C.
- La partie F est indépendante du reste du problème.
- La partie G est indépendante du reste du problème à l'exception de la question G2c.

## Partie A : Quelques résultats généraux

On suppose que  $f$  admet une racine carrée  $u$ .

- 1) Montrer que  $-u$  est encore une racine carrée de  $f$ .
- 2) Montrer que  $u$  et  $f$  commutent.
- 3) Montrer que  $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(f)$  et que  $\text{Im}(f) \subset \text{Im}(u)$ .
- 4) En déduire que  $f$  est bijective si et seulement si  $u$  est bijective.
- 5) On suppose de plus que  $E$  est de dimension finie. Justifier que, si  $\text{Ker}(f)$  est de dimension 1, alors  $\text{Ker}(u) = \text{Ker}(f)$ .

## Partie B : Une famille d'exemples en dimension 3

Dans cette partie, on suppose que  $E = \mathbb{R}^3$  et on considère l'endomorphisme  $f$  de  $\mathbb{R}^3$  défini par

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad f((x, y, z)) = (-3x - 4y + 6z, 6x + 7y - 9z, 2x + 2y - 2z)$$

- 1) Montrer que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$ .
- 2) Déterminer  $v_1 \in \mathbb{R}^3$  tel que  $\text{Ker}(f) = \text{Vect}(v_1)$ .  
*On impose que  $v_1$  soit à coordonnées entières.*
- 3)
  - a) Montrer que  $2x + 2y - 3z = 0$  est une équation de  $\text{Im}(f)$ .
  - b) Notons  $v_2 = (0, 3, 2)$  et  $v_3 = (1, -1, 0)$ . Vérifier, à l'aide de la question précédente que  $(v_2, v_3)$  est une base de  $\text{Im}(f)$ .
  - c) En déduire<sup>1</sup> que  $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$ .
- 4)
  - a) En déduire que  $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$  est une base puis montrer que  $f^2 = f$  à l'aide de calculs dans la base  $\mathcal{B}$ .  
*Tout calcul direct de  $f^2$  à partir de l'expression explicite de  $f$  est exclu.*
  - b) Comment aurait-on pu obtenir la question B3c autrement ? Proposez deux méthodes différentes (sans les mettre en œuvre).
- 5) Justifier que, pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}^*$ , il existe un unique endomorphisme  $f_\alpha$  de  $\mathbb{R}^3$  tels que

$$f_\alpha(v_1) = 0, \quad f_\alpha(v_2) = v_2 \quad \text{et} \quad f_\alpha(v_3) = \alpha v_3.$$

Vérifier que  $f_1 = f$  et montrer que, pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}^*$ ,  $\text{Im}(f_\alpha) = \text{Im}(f)$  puis que  $\text{Ker}(f_\alpha) = \text{Ker}(f)$ .

- 6) Soit  $\alpha \in \mathbb{R}^*$ . Supposons que  $f_\alpha$  admette une racine carrée  $u$ .
  - a) À l'aide de la partie A, montrer que  $\text{Ker}(u) = \text{Ker}(f_\alpha)$  et que  $\text{Im}(f_\alpha)$  est stable par  $u$ .
  - b) En déduire qu'il existe  $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$  tel que
$$u(v_2) = av_2 + cv_3 \quad \text{et} \quad u(v_3) = bv_2 + dv_3.$$
  - c) Montrer que  $a^2 + bc = 1$ ,  $d^2 + bc = \alpha$  et  $(a + d)b = (a + d)c = 0$ .
  - d) Montrer que, si  $\alpha \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ , alors  $b = c = 0$  et le couple  $(a, d)$  peut prendre 4 valeurs que l'on explicitera.
  - e) Montrer que, si  $\alpha = 1$ , alors  $bc \leq 1$  et exprimer  $(a, d)$  en fonction de  $b$  et  $c$ .
  - f) Que dire si  $\alpha < 0$  ?
- 7) Proposer une racine carrée de  $f$  qui n'est pas  $f$ .  
*On pourra se contenter de décrire l'action de  $f$  sur la base  $\mathcal{B}$ .*

On voit sur cette famille d'exemples que la recherche de racines carrées d'endomorphisme est complexe : rien qu'en dimension 3, il peut y avoir quatre racines carrées, une infinité, aucune... voire d'autres cas de figure encore.

## Partie C : Rang d'une racine carrée d'endomorphisme

Dans cette partie  $E$  désigne un espace vectoriel quelconque de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $f$  un endomorphisme quelconque de  $E$  admettant une racine carrée  $u$ .

- 1) On note  $\tilde{u}$  la restriction de  $u$  à  $\text{Im}(u)$ . Montrer que

$$\text{Ker}(\tilde{u}) = \text{Ker}(u) \cap \text{Im}(u) \quad \text{et} \quad \text{Im}(\tilde{u}) = \text{Im}(f).$$

1. On lira la question suivante avant de foncer tête baissée sur celle-ci.

2) Montrer alors que

$$\operatorname{rg}(u) = \operatorname{rg}(f) + \dim(\operatorname{Ker}(u) \cap \operatorname{Im}(u)).$$

3) a) En déduire que  $2 \operatorname{rg}(u) \leq \operatorname{rg}(f) + n$ .

b) Montrer que  $2 \operatorname{rg}(u) = \operatorname{rg}(f) + n$  si et seulement si  $\operatorname{Ker}(u) \subset \operatorname{Im}(u)$ .

### Partie D : Le cas diagonalisable avec valeurs propres simples

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Dans cette partie,  $E$  désigne un espace vectoriel de dimension finie  $n$  et  $f$  un endomorphisme de  $E$ . On suppose qu'il existe<sup>1</sup> une base  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  et des scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  tels que  $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$  et

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \quad f(\varepsilon_i) = \lambda_i \varepsilon_i.$$

On dit alors que  $f$  est diagonalisable avec valeurs propres simples. Supposons enfin que  $f$  admette une racine carrée  $u$ .

1) a) Justifier que, pour tout  $j \in \llbracket 1; n \rrbracket$ , il existe des scalaires  $b_{1,j}, \dots, b_{n,j}$  tels que  $u(\varepsilon_j) = \sum_{i=1}^n b_{i,j} \varepsilon_i$ .

b) En utilisant le fait que  $u$  et  $f$  commutent (cf. partie A), établir que  $b_{i,j} = 0$  pour tout  $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$  tel que  $i \neq j$ .

c) En déduire que  $\lambda_i = b_{i,i}^2$  pour tout  $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ .

2) Conclure que  $f$  admet  $2^n$  racines carrées lorsque  $\lambda_1 > 0$ ,  $2^{n-1}$  lorsque  $\lambda_1 = 0$  et aucune lorsque  $\lambda_1 < 0$ .

On a dans la partie B que, lorsque les  $\lambda_i$ ,  $1 \leq i \leq n$  ne sont pas tous distincts,  $f$  peut admettre une infinité de racines carrées ou aucune racines carrées. Le cas général est difficile à décrire intégralement. Par ailleurs, toute matrice n'est pas diagonalisable (comme nous allons le voir dans la prochaine partie) et, quand elle l'est, ses valeurs propres ne sont pas forcément simples (c'est tout un chapitre en deuxième année).

### Partie E : Le cas nilpotent

1) On définit l'application  $\varphi$  sur  $\mathbb{R}_3[X]$  par

$$\forall P \in \mathbb{R}_3[X], \quad \varphi(P) = P(-1)(X^3 + 1) + P(0)X(X + 1).$$

a) Montrer que  $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_3[X])$ .

b) Déterminer une base de  $\operatorname{Ker}(\varphi)$  et une base de  $\operatorname{Im}(\varphi)$ .

c) Expliciter  $\varphi^2$  puis vérifier que  $\varphi^3$  est nul.

L'endomorphisme  $\varphi$  est un exemple d'endomorphisme dit nilpotent. Nous allons étudier plus généralement ce cas de figure dans cette partie.

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On suppose que  $E$  est un espace vectoriel de dimension finie  $n$ . On se donne  $f$  un endomorphisme nilpotent, c'est-à-dire tel qu'il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $f^k = 0$ .

2) On suppose que  $f$  est diagonalisable, c'est-à-dire qu'il existe une base  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  et des scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  tels que, pour tout  $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ ,  $f(\varepsilon_i) = \lambda_i \varepsilon_i$ .

a) Montrer que  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ .

b) Conclure que, si  $f \neq 0$ , alors  $f$  n'est pas diagonalisable.

On suppose que  $f \neq 0$  et on note  $p$  le plus petit entier tel que  $f^p = 0$  et on l'appelle l'indice de nilpotence de  $f$ . Il vérifie donc  $p \geq 2$ ,  $f^{p-1} \neq 0$  et  $f^p = 0$ .

3) Justifier l'existence de  $p$ .

---

1. C'est le cas des endomorphismes  $f_\alpha$  de la partie B lorsque  $\alpha \notin \{0; 1\}$ . Mais dans cette partie, nous revenons en dimension quelconque.

4) Supposons que  $f$  admette une racine carrée  $u$ . On a donc  $u^{2p-2} \neq 0$  et  $u^{2p} = 0$ .

a) Montrer qu'il existe  $x_0 \in E$  tel que, pour tout  $k \in \llbracket 0; 2p-2 \rrbracket$ ,  $u^k(x_0) \neq 0$ .

b) On se donne  $a_0, \dots, a_{2p-2}$  des réels tels que  $\sum_{k=0}^{2p-2} a_k u^k(x_0) = 0$ .

En raisonnant par l'absurde, montrer que ces réels sont nuls.

c) Dédire de cette absurdité que  $2p-1 \leq n$ .

On vient de montrer une condition nécessaire pour que  $f$  nilpotente non nulle admette une racine carrée : si  $f$  admet une racine carrée, alors l'indice de nilpotence de  $f$  est inférieur ou égal à  $\frac{n+1}{2}$ .

d) L'endomorphisme de l'exemple de la question E1 admet-il une racine carrée ?

Dans la suite de cette partie, nous examinons le cas particulier où  $\text{Ker}(f) = \text{Im}(f)$ . Notons  $r$  le rang de  $f$ .

5) a) Montrer que  $f$  est nilpotente d'indice 2 et que  $n = 2r$ .

b) Supposons que  $f$  admette une racine carrée  $u$ . À l'aide des parties A et C, montrer alors que  $4(n - \text{rg}(u)) = n$ .

Ainsi  $n$  est un multiple de 4.

6) Réciproquement, supposons que  $n$  est un multiple de 4 et que  $\text{Ker}(f) = \text{Im}(f)$ . Notons  $k = \frac{n}{4}$ . La question précédente assure que  $f$  est nilpotente d'indice 2 et que son rang est  $r = \frac{n}{2} = 2k$ .

a) Montrer qu'il existe  $x_1, \dots, x_r$  des vecteurs de  $E$  tels que  $(f(x_1), \dots, f(x_r))$  est une base de  $\text{Im}(f)$ .

b) En déduire que  $(x_1, \dots, x_r, f(x_1), \dots, f(x_r))$  est une base de  $E$ .

c) Justifier qu'il existe un unique endomorphisme  $u$  de  $E$  tel que

$$\forall i \in \llbracket 1; k \rrbracket, \quad u(x_{2i-1}) = x_{2i}, \quad u(x_{2i}) = f(x_{2i-1}), \quad u(f(x_{2i-1})) = f(x_{2i}), \quad u(f(x_{2i})) = 0$$

et montrer que  $u^2 = f$ .

On vient de montrer que, si  $\text{Im}(f) = \text{Ker}(f)$  (ce qui est un cas particulier des endomorphismes nilpotents d'indice 2), alors  $f$  admet une racine carrée si et seulement si  $n$  est un multiple de 4.

### Partie F : Le cas des endomorphismes scalaires

Dans cette partie  $E$  désigne un espace vectoriel quelconque (pas forcément de dimension finie) non réduit à  $\{0_E\}$ .

1) Que dire d'une racine carrée de  $\text{Id}_E$  ? Justifier que  $u \in \mathcal{L}(E)$  est une racine carrée de  $\text{Id}_E$  si et seulement si  $p = \frac{1}{2}(u + \text{Id}_E)$  est un projecteur de  $E$ . Le projecteur  $p$  est alors appelé projecteur associé à  $u$ .

2) Supposons, dans cette question uniquement, que  $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . On rappelle que  $E$  est alors de dimension infinie. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Notons  $F_n$  l'ensemble des fonctions polynomiales de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  dont le degré du polynôme associé est au plus  $n$ . Notons aussi

$$G_n = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket, f^{(k)}(0) = 0\}.$$

a) Justifier que  $F_n$  est l'image de  $\mathbb{R}_n[X]$  par une application linéaire injective de  $\mathbb{R}[X]$  dans  $E$ . En déduire que  $F_n$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $n+1$ . On admet que  $G_n$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

b) Montrer que  $F_n \oplus G_n = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

c) Est-ce que  $G_n$  est de dimension finie ?

d) En déduire une expression explicite d'une racine carrée de  $\text{Id}_E$  dont le projecteur associé est de rang  $n+1$ .

Cette question étant valable pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , il y a donc une infinité de racines carrées de  $\text{Id}_E$  dans ce cas particulier.

- 3) Supposons, dans cette question, que  $E$  est un espace vectoriel quelconque de dimension finie supérieure ou égale à 2.
- Justifier que  $E$  admet une infinité de droite vectorielles puis en déduire qu'il existe une infinité de projecteurs de rang 1.
  - En déduire que  $\text{Id}_E$  admet une infinité de racines carrées.
  - Que dire des racines carrées de  $\alpha \text{Id}_E$  lorsque  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$  ?
- 4) Supposons toujours que  $E$  est un espace vectoriel quelconque de dimension finie non nulle. Supposons que  $-\text{Id}_E$  admet une racine carrée  $u$ , c'est-à-dire  $u^2 = -\text{Id}_E$ .
- Justifier qu'il existe  $x_1 \in E \setminus \{0_E\}$  et que  $(x_1, u(x_1))$  est libre.
  - Soit  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$ . On suppose qu'il existe  $x_1, \dots, x_n$  dans  $E$  tels que la famille
 
$$(x_1, \dots, x_{n-1}, u(x_1), \dots, u(x_{n-1}))$$
 est libre. Montrer que, si  $\dim(E) \geq 2n - 1$ , alors il existe  $x_n \in E$  tel que
 
$$(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n, u(x_1), \dots, u(x_{n-1}))$$
 est libre.
  - Montrer que l'ajout de  $u(x_n)$  à cette famille libre conserve sa liberté.
  - En déduire que  $\dim(E)$  est paire.
  - Réciproquement, montrer que, si  $\dim(E)$  est paire, alors  $-\text{Id}_E$  admet une racine carrée.
  - Que dire des racines carrées de  $\alpha \text{Id}_E$  lorsque  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$  ?

### Partie G : Racines carrées en lien avec la dérivation des polynômes

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On suppose dans cette partie que  $E = \mathbb{R}_n[X]$ . On considère l'endomorphisme  $d$  de  $\mathbb{R}_n[X]$  défini par :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \quad d(P) = P'.$$

On ne demande pas de montrer que  $d$  est un endomorphisme de  $E$ .

On note simplement  $I$  pour désigner  $\text{Id}_E$ . L'objectif est de montrer que, pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ , l'endomorphisme  $d + \lambda I$  admet une racine carrée si et seulement si  $\lambda > 0$ .

- Déterminer  $\text{Ker}(d)$  puis prouver que  $\text{Im}(d) = \mathbb{R}_{n-1}[X]$ .
- Supposons que  $d + \lambda I$  admette une racine carrée  $u$ .
  - Montrer que  $d$  et  $u$  commutent et justifier qu'il existe  $a \in \mathbb{R}$  tel que  $u(1) = a$ .
  - Montrer alors que  $\lambda \geq 0$ .
  - Montrer que  $d$  est nilpotent d'indice  $n + 1$  puis conclure que  $\lambda > 0$ .  
*La notion d'endomorphisme nilpotent est définie dans la partie E.*
- Nous venons donc de montrer que si  $d + \lambda I$  admet une racine carrée, alors  $\lambda > 0$ . Nous allons maintenant montrer la réciproque : supposons que  $\lambda > 0$ .
  - Justifier qu'il existe un polynôme  $P_n \in \mathbb{R}_n[X]$  (que l'on ne cherchera pas à expliciter) tel que
 
$$\sqrt{1+x} \underset{0}{=} P_n(x) + o(x^n).$$
  - Notons  $Q_n$  et  $R_n$  le quotient et le reste de la division euclidienne de  $P_n^2$  par  $X^{n+1}$ . Justifier que
 
$$1+x \underset{0}{=} R_n(x) + o(x^n).$$
  - En déduire que  $R_n = 1 + X$ .
 Posons  $g = P_n \left(\frac{1}{\lambda}d\right)$ , le polynôme  $P_n$  en l'endomorphisme  $\frac{1}{\lambda}d$ . Il s'agit d'un endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
  - Vérifier que  $g^2 = I + \frac{1}{\lambda}d$ .  
*On pensera bien à utiliser les formules sur les polynômes d'endomorphismes, rappelées en préambule.*
  - En déduire un endomorphisme  $u$  tel que  $u^2 = d + \lambda I$ .