

# Propriétés des nombres réels

**Exercice 1.** (★) Sans calculatrice, simplifier :

$$1) \frac{12 \times 27 \times 28 \times 7700}{24 \times 18 \times 42 \times 35 \times 55}, \quad 2) \frac{5}{56} - \frac{1}{42} - \frac{7}{30} + \frac{11}{40}, \quad 3) \frac{\frac{120 \times 239 - 119}{119 \times 239}}{\frac{119 \times 239 + 120}{119 \times 239}} - 1.$$

**Exercice 2.** (★) Sans calculatrice, déterminer le signe des expressions suivantes :

$$1) \frac{7}{4} - \sqrt{3}, \quad 2) 3\sqrt{5} - 2\sqrt{19} + \sqrt{7}, \quad 3) \sqrt{208} + \sqrt{89} - \sqrt{569}, \quad 4) \pi - \sqrt{10}.$$

**Exercice 3.** (★) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Simplifier les expressions suivantes :

$$1) 2^{n+1} - 2^n, \quad 2) 3^n + 3^n + 3^n, \quad 3) (5^{5^n})^{5^n}, \quad 4) (-1)^{2-7n} + \frac{1}{(-1)^{5-9n}}, \quad 5) \frac{1}{\sqrt{n^4+4} + \sqrt{n^4+3}}.$$

**Exercice 4.** (★) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Simplifier les expressions suivantes :

$$1) 5^{(3^2)} - (5^3)^2, \quad 2) 4^{3^{2^{198765}}}, \quad 3) (-1)^{9^{765432}}, \quad 4) \sqrt[5]{25 \times 90 \times 72 \times 150}.$$

**Exercice 5.** (★) Soient  $x$  et  $y$  des réels positifs tels que  $y \leq x^2$ . Montrer que

$$\sqrt{x + \sqrt{y}} = \sqrt{\frac{x + \sqrt{x^2 - y}}{2}} + \sqrt{\frac{x - \sqrt{x^2 - y}}{2}}.$$

**Exercice 6.** (★★) Pour quelles valeurs des réels  $x$  et  $y$ , l'expression

$$\sqrt{2 + \frac{x + \sqrt{x^2 - y^2}}{x - \sqrt{x^2 - y^2}} + \frac{x - \sqrt{x^2 - y^2}}{x + \sqrt{x^2 - y^2}}}$$

est-elle définie ? La simplifier le cas échéant.

**Exercice 7.** (★) Soit  $x$  un réel. Compléter par  $\Rightarrow$ ,  $\Leftarrow$  ou  $\Leftrightarrow$  si c'est possible :

$$1) x^2 = 36 \dots x = 6. \quad 3) |x| \leq 2 \dots -2 \leq x \quad 5) x^{-4} \leq 16 \dots x \leq -1/2$$

$$2) |x| > 4 \dots x < -5 \quad 4) 3|x| \geq x^2 \dots -3 \leq x \leq 3. \quad 6) x^2 \leq x \dots x \geq 0.$$

**Exercice 8.** (★) Soient  $a, b, c$  et  $x$  des réels avec  $a \neq 0$ . Sous quelles hypothèses a-t-on  $ax^2 + bx + c < 0$  ?

**Exercice 9.** (★) Montrer que, pour tous réels positifs  $x$  et  $y$ ,  $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$  avec égalité si et seulement si  $x = y$ .

**Exercice 10.** (★) Montrer que, pour tout  $x \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$ ,  $\frac{1}{\sqrt{1-x}} \leq 1 + x$ .

**Exercice 11.** (★★)

- 1) Montrer que, pour tout  $(x, y) \in (\mathbb{R}_+)^2$ ,  $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{2} \sqrt{x+y}$ .
- 2) Examiner le cas d'égalité de cette inégalité.
- 3) En déduire que, pour tout  $(x, y, z) \in (\mathbb{R}_+)^2$ ,  $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \leq \sqrt{\frac{x+y}{2}} + \sqrt{\frac{y+z}{2}} + \sqrt{\frac{z+x}{2}}$ .

**Exercice 12.** (★★) Montrer que, si  $n$  est le produit de quatre entiers naturels consécutifs, alors  $n + 1$  est le carré d'un entier.

On pourra commencer par développer  $(ax^2 + bx + c)^2$  lorsque  $a, b, c$  et  $x$  désignent des réels.

**Exercice 13.** (★) Résoudre les équations suivantes, d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$  :

- |   |  |
|---|--|
| 1) $ 7x - 4  =  3 - 2x $ ,              | 6) $(9 - x)(x + 3) = 30$ ,               |
| 2) $ x - 19  =  x + 11 $ ,              | 7) $ x^2 + x - 3  =  x $ ,               |
| 3) $ 5 - x  = 2x$ ,                     | 8) $6x^4 + 11x^2 - 7 = 0$ ,              |
| 4) $ 4 - x  -  x + 2  +  3x + 5  = 9$ , | 9) $\sqrt{x+9} = x - 3$ ,                |
| 5) $13x - 5x^2 = 9$ ,                   | 10) (★★) $\sqrt{1+x} - \sqrt{4-x} = 2$ , |

**Exercice 14.** (★★) Résoudre le système d'équation  $\begin{cases} 3x + y = 12 \\ xy = 9 \end{cases}$  d'inconnues  $x$  et  $y$  dans  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 15.** (★★) Soit  $(a, b, c) \in (\mathbb{R}_+)^2$  avec  $a > 0$  et  $b < c$ . Résoudre l'équation  $\sqrt{x+b} + \sqrt{x+c} = a$ , d'inconnue  $x$  dans  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 16.** (★) Résoudre l'équation  $3x^2 + y^2 + z^2 = 2x(y+z)$  d'inconnues  $x, y$  et  $z$  dans  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 17.** (★) Résoudre les inéquations suivantes, d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$  :

- |                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| 1) $2x^2 + 25x - 42 > 0$ , | 5) $ x^2 - 6x + 7  < 1$ .                | 8) $2(x-2)(1-2x) + 1 < x(x+3)$ ,                    |
| 2) $ 2x-5  <  x+3 $ ,      | 6) $23x^2 - 12x^4 \geq 10$ ,             | 9) $\frac{1}{3x^2+2x+4} \geq \frac{2}{5x^2+6x+1}$ , |
| 3) $x^2 - 4 x  \leq 5$ ,   | 7) $\sqrt{x} > 1 + \frac{6}{\sqrt{x}}$ , | 10) (★★) $2x - 5 - \sqrt{4x-7} < 0$ .               |
| 4) $ x+3  -  1-3x  > -2$ , |  |   |

**Exercice 18.** (★★) Posons  $x_0 = \sqrt[3]{5\sqrt{2}+7} - \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}$ .

- Vérifier que  $x_0^3 + 3x_0 - 14 = 0$ .
- Montrer qu'il existe deux réels  $a$  et  $b$  tels que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x^3 + 3x - 14 = (x-2)(x^2 + ax + b)$ .
- En déduire que  $x_0 = 2$ .

**Exercice 19.** (★) Soit  $n$  un entier naturel. Exprimer le plus grand entier naturel  $m$  vérifiant  $2m \leq n$  et le plus grand entier naturel  $p$  vérifiant  $2p+1 \leq n$ , en fonction de  $n$ .

**Exercice 20.** (★) Calculer  $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$  pour tout réel  $x$ .

**Exercice 21.** (★) Montrer que, pour tous réels  $x$  et  $y$ ,  $\lfloor x+y \rfloor - \lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor \in \{0; 1\}$ .

**Exercice 22.** (★) Soit  $(a, x, T) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^*$ . Montrer qu'il existe un unique  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $x + kT \in [a; a+T[$ . Exprimer  $k$  à l'aide de parties entières.

**Exercice 23.** (★★) Résoudre l'équation  $\lfloor 2x+5 \rfloor = \lfloor x-1 \rfloor$ , d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$ .

**Exercice 24.** (★★) Résoudre l'équation  $\lfloor 3x-2 \rfloor = \lfloor x \rfloor^2$ , d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$ .

**Exercice 25.** (★★) Soient  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^2$ . Préciser si les ensembles suivants sont majorés ou minorés et donner, lorsque c'est possible, leur minimum et leur maximum :

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1) $] -5; 2]$ ,                               | 6) $\left\{ \frac{a}{n} + b \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ ,              | 9) $\{an^2 - bn + c \mid n \in \mathbb{N}\}$ ,   |
| 2) $\mathbb{R}_+^*$ ,                         | 7) $\left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ ,         | 10) $\left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{p} \mid (n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}$ ,      |
| 3) $[-7; -3] \cup ]6; 7[$ ,                   | 8) $\left\{ \frac{1}{3n} - \frac{2}{n^2} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ , | 11) $\left\{ \frac{1}{n} + \frac{(-1)^p}{p} \mid (n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}$ . |
| 4) $\{(-1)^n a + b \mid n \in \mathbb{N}\}$ , |  |  |
| 5) $\{an + b \mid n \in \mathbb{N}\}$ ,       |  |  |

On poursuivra cet exercice dans le TD n° 14.

**Exercice 26.** (★★) Déterminer un majorant et un minorant (grossiers) de l'ensemble

$$A = \left\{ \frac{4x^2 - 2x^4 + 3}{x^4 + x^2 - x + 1} \mid 0 \leq x \leq 1 \right\}.$$

On poursuivra cet exercice dans le TD n° 4.